



سال تهیه: بهار ۱۳۹۴

بازنگری: ۱۴۰۰

۶۷-۳۲۳۳۲۰۶۵ (داخلی ۲۹۲)

www.Bimaramozesh.blogfa.com[Telegram.me/bimar_amozech](https://t.me/bimar_amozech)

کد: B.H.E. 14

آسپرین (آ.اس.آ)

داروی آ.اس.آ شکل قرص های پوشش دار و بدون پوشش در میزان های ۸۰-۱۰۰-۳۲۵-۵۰۰ میلی گرم موجود می باشد. قرص های ۸۰ میلی گرمی و ۵۰۰ میلی گرمی جزء داروهای پوشش دار می باشد بدین معنی که این قرص ها در روده باز می شوند و در بیماران که مشکلات زخم معده دارند بهتر است. (بیماران عزیز با مطالعه روی جلد قرص دو حرف ایی و سی را می خوانند که به معنی پوشش دار است).

موارد مصرف:

قرص آ.اس.آ به منظور تسکین درد، ضد تب و پیشگیری از سکت قلبی و مغزی استفاده می شود.

نحوه نگهداری دارو



قرص های آ.اس.آ در معرض حرارت، رطوبت و هوا به سرعت خراب می شوند بنابراین قبل از مصرف آن را بو کنید در صورت احساس بوی سرکه همه قرص ها را دور بریزید.

در هنگام مصرف قرص آ.اس.آ بهتر است به نکات زیر توجه

فرماید:

- در صورت تحریک معده بهتر است که قرص آ.اس.آ همراه با یک لیوان پر از آب، شیر یا غذا مصرف شود
- به مدت ۱۵ الی ۳۰ دقیقه بعد از مصرف دارو از دراز کشیدن خودداری کنید.
- یک الی دو ساعت بعد از مصرف قرص آ.اس.آ از مصرف شربت آنتی اسید خودداری کنید. برای جلوگیری از آسیب بافت دهان قرص آ.اس.آ را روی لثه یا دندان قرار ندهید
- قرص های پوشش دار هرگز نباید خرد شده یا جویده شوند.
- در صورت نیاز به هرگونه جراحی از مصرف آ.اس.آ از ۵ روز قبل از عمل جراحی خودداری کنید مگر اینکه پزشک یا دندانپزشک دستور داده باشد زیرا خطر بروز خونریزی وجود دارد.
- هنگامی که آسپرین به عنوان ضد درد در خانم ها به منظور کاهش انقباضات رحمی در دوره قاعدگی مصرف می شود بهتر است یک یا دو روز قبل مصرف شوند و در بیماران که خونریزی زیادی دارند توصیه می شود به جای آسپرین از یک ضد درد دیگر مانند استامینوفن استفاده شود.

- تجویز آ.اس.آ با میزان بالا در خلال سه ماه آخر حاملگی می تواند حاملگی وزایمان را طولانی نموده و خونریزی مادر قبل و بعد از زایمان را افزایش دهد و موجب افزایش خونریزی در نوزاد شود.
- دربالغین و کودکان آسپیرین هرگز نباید بیشتر از سه روز برای تب بالاتر از ۳۹/۵ مصرف شود.
- مصرف طولانی دوزهای بالای آ.اس.آ می تواند منجر به کم خونی فقر آهن بویژه در زنان گردد.
- به منظور جلوگیری از تشکیل سنگ کلیه مصرف کافی مایعات توصیه می شود.
- دربیماران قلبی مصرف ضد انعقاد مانند وارفارین و هپارین خطر خونریزی را افزایش می دهد.
- درموارد مصرف همزمان آ.اس.آ و کورتون ها عوارض معده ای افزایش می یابد.

نشانه های مسمومیت با مصرف بالای آ.اس.آ :

- ✓ علائم خونریزی برای مثال تشکیل دانه های قرمز روی پوست ، کبود شدن پوست ، خونریزی از لثه ، مدفوع خونی یا تیره ، ادرار خونی یا کدر از نشانه های مسمومیت با این دارو می باشد که باید گزارش داده شود .
- ✓ دربالغین احساس پری درگوشها ، وزوز گوش و کاهش یا فقدان شنوایی نشانه مصرف مقادیر زیاد این دارو می باشد که با قطع آن به تدریج بهتر می شود .
- ✓ مسمومیت درکودکان شامل علائمی نظیر تنفس طولانی عمیق و سریع، پریشانی، تغییرات رفتاری، خواب آلودگی، بی حالی، تعریق و یبوست می باشد
- ✓ درکودکان و بویژه نوزادان در معرض خطر کم آبی مانند تب و اسهال و ضعف خطر مسمومیت با این دارو افزایش پیدا می کند .
- ✓ امکان بروز واکنش حاد در بیماری که حساسیت به دارو ندارد ممکن است ایجاد شود .
- ✓ در افراد با سابقه حساسیت به آسپیرین، آسم، کهیر، سابقه خونریزی معده یا سایر مشکلات گوارشی، کمبود ویتامین(کا)، هموفیلی، نوزادان، کودکان کمتر از دو سال در موارد سرماخوردگی ، آنفولانزا، شیر خواران، بیماران دارای مشکلات کبدی و کلیوی، کم خونی نباید مصرف شود و پزشک خود را از داشتن این بیماریها آگاه نمود.



مشاور علمی: خانم دکتر ناهید زمانی (متخصص قلب و عروق)

منبع: عسگری، م و سلیمانی، م. مراقبت های پرستاری ویژه در بخش های ICU,CCU و دیالیز،

بشری- نشر حکیم هیدجی، ۱۳۸۹، چاپ شانزدهم