

شما در اثر آسیب، دچار زخم باز، در ناحیه ای از بدن شده اید. در حال حاضر با توجه به این که زخم شما کاملا بررسی و پاکسازی شده و سایر معاینات طبیعی و سالم بوده اند، نیاز به جراحی یا بستری در بیمارستان نداشته و می توانید به منزل باز گردید.

توصیه های مهم

● بخیه کردن برای زخم هایی به کار می رود که وسیع بوده یا لبه های آن از هم دور باشند یا کناره های زخم نامنظم و ناهموار یا دچار له شدگی و تخریب پوست باشند و یا زخم آن قدر عمیق بوده که کل ضخامت پوست را در بر گرفته باشد، که تشخیص آن تنها با پزشک خواهد بود و در غیر این صورت زخم نیاز به بخیه نخواهد داشت، در این مورد به تصمیم پزشک اعتماد کنید و نگران نباشید.

● هر چند بسیاری از زخم ها، احتمالا بدون بخیه زدن در هر صورت بهبود خواهند یافت اما توجه کنید که بخیه زدن باعث خواهد شد زخم سریع تر بهبود یافته و کمتر دچار عوارضی مانند عفونت شود و پس از بهبودی محل زخم دچار بد شکلی نشده و زخم، جوشگاه یا اسکار (جای زخم) کوچکتری بر جای می گذارد.

● بخیه ها را تا ۲۴ ساعت کاملا خشک نگاه دارید، این زمان در مورد بخیه های قابل جذب بیشتر است و زمان دقیق آن را پزشک به شما خواهد گفت.

● بخیه های غیر قابل جذب را پس از ۲۴ ساعت می توانید به آرامی با آب گرم و صابون بشوئید، اما به هیچ وجه آنها را به مدت طولانی در آب غوطه ور نکنید (مثلا در وان حمام، استخر...) چون تماس زیاد با آب باعث کاهش سرعت بهبود زخم و افزایش احتمال عفونت می شود.

● بخیه ها را بلافاصله با ملایمت خشک کنید، برای این کار از یک گاز استریل استفاده کنید و به هیچ وجه از پنبه یا دستمال کاغذی استفاده نکنید، دقت کنید که برای خشک کردن نباید پارچه را روی زخم به سختی بکشید و فقط از حرکات ضربه ای ملایم استفاده کنید.

● به هیچ وجه از الکل، بتادین، آب اکسیژنه، محلولهای ضد عفونی کننده، کرم های آرایشی یا نرم کننده، روغن های معطر یا پماد های کورتونی روی زخم استفاده نکنید، این مواد باعث تحریک پوست، بروز حساسیت، عفونت و تاخیر ترمیم زخم خواهد شد.

● در صورتی که زخم شما پانسمان شده است حتما تا زمانی که پزشک به شما هنگام ترخیص توصیه کرده زخم را پوشیده نگاه دارید (معمولا یک هفته). در این صورت حداقل ۴۸ ساعت پانسمان را به شکل اولیه حفظ کرده و سپس بعد از هر بار شستشوی زخم آن را با یک پانسمان سبک بپوشانید.

● توجه کنید که همه ی زخم ها نیاز به پانسمان ندارند و ممکن است زخم شما (به خصوص زخم های پوست سر و صورت) پس از شستشو و حتی بخیه زدن بدون پانسمان رها شود، در این صورت شخصا اقدام به پوشاندن زخم با پانسمان های سنگین نکنید.

● زخم های پوستی اغلب با بخیه های غیر قابل جذب بخیه می شوند، زمان دقیق کشیدن بخیه ها را پزشک هنگام ترخیص به شما خواهد گفت، بخیه های صورت معمولا ۳-۶ روز و بخیه های پوست سر و اندام ها ۷-۱۴ روز بعد کشیده می شوند.

● از انجام فعالیت های جسمی یا ورزش های سنگین که باعث فشار یا ضربه به محل زخم می شود در طول ۱-۲ هفته آینده خودداری کنید. چون اگر دوباره به همان محل قبلی ضربه وارد شود ممکن است باعث آسیب بخیه ها یا باز شد دوباره ی زخم شود.

● شکل نهایی پوست در جای زخم ۶-۱۲ ماه بعد کاملا مشخص خواهد شد و در این مدت ممکن است محل زخم تیره تر و برجسته تر از پوست طبیعی باشد، در این دوره استحکام و قدرت پوست کمتر از حالت طبیعی خواهد بود و در برابر ضربه های مشابه آسیب پذیرتر است.

● خارش خفیف زخم در روز های ابتدایی طبیعی است، در این موارد از خاراندن زخم خودداری کنید و فقط پوست را ماساژ دهید.

● ترشح خفیف به صورت مایع زرد کم رنگ، رقیق و آبکی در روزهای اول از زخم طبیعی است.

● تا زمان ترمیم کامل پوست محل زخم، باید آن را از نور خورشید محافظت کنید، می توانید از ضد آفتاب یا کلاه و لباس پوشیده استفاده کنید.



بیمارستان عیسی بن مریم (ع)

راهنمای مراقبت از زخم



واحد آموزش به بیمار

تدوین: زمستان ۱۳۹۴

بازنگری: بهار ۱۴۰۰

کد پمفلت: H.E.10

شماره تماس با واحد آموزش به بیمار:

۶۷-۳۲۳۳۲۰۶۵ (داخلی ۲۹۲)

www.Bimaramozesh.blogfa.com

[Telegram.me/bimar_amoresh](https://t.me/bimar_amoresh)

Insta:isa-diabet

❖ خطوط قرمز رنگ برجسته اطراف محل زخم.

❖ بروز تب.

❖ برجسته و دردناک شدن غده های لنفی زیر بغل، گردن

یا کشاله ران (نزدیک به محل زخم).

❖ در صورت نیاز به مراجعه مجدد حتما خلاصه پرونده خود

را همراه داشته باشید.

به نکات زیر در مورد تعویض پانسمان توجه کنید:

✓ روزانه حداقل یک بار پانسمان را تعویض کنید .

✓ در صورت خیس شدن، کثیف شدن، آلودگی به ترشح یا

خونابه هم نیاز به تعویض پانسمان خواهید داشت.

✓ پیش از تعویض پانسمان وسایل لازم شامل دستکش، گاز،

باند، چسب، پماد و کیسه ی پلاستیکی را آماده کنید.

✓ دستان خود را با آب و صابون به خوبی بشوئید. از

دستکش استفاده کنید.

✓ پانسمان کهنه را به آرامی و ملایمت و بدون حرکت سریع

و ناگهانی از روی زخم بردارید و چنانچه در اثر خشک

شدن ترشحات به زخم چسبیده است آن را کمی مرطوب

کنید. پانسمان قبلی را در کیسه پلاستیکی ضخیم گذاشته،

درب آن را کاملا محکم ببندید و دور بیندازید.

✓ تا زمانی که زخم کاملا خشک نشده و دارای ترشح و

رطوبت است، بهتر است هنگام تعویض پانسمان یک عدد

گاز وازلین روی زخم بگذارید و سپس زخم را پانسمان

کنید تا مانع چسبیدن باند به زخم شود، بسته های گاز

وازلینه را می توانید به راحتی از داروخانه تهیه کنید.

✓ باند را روی محل زخم گره نزنید .

✓ چسب ها را یک دور کامل به دور اندام نپیچید تا محکم

بودن آن مانع خونرسانی مناسب نشود.

✓ پس از پایان کار دستان خود را مجدد بشوئید .

✓ مشاور علمی: آقای دکتر مسیح معصومی (متخصص جراحی

عمومی)

منبع: عزیز خانی، ر و همکاران. طرح دینا وزارت بهداشت، درمان و

آموزش پزشکی ۱۳۹۲.

● در صورتی که برای شما آتل گیری شده است آن را تا زمان کشیدن بخیه ها و ترمیم اولیه زخم حفظ کنید.

● شما محدودیت غذایی ندارید، اما توصیه می شود تا زمان ترمیم زخم از رژیم پرپروتئین و پرکالری مانند میوه ها، سبزیجات و آبمیوه های سرشار از ویتامین ث، مثل مرکبات، لیمو ترش، گوجه فرنگی، آب لیمو و آب پرتقال، گوشت و ماهی بیشتر استفاده کنید .هم چنین توانید از قرص ها یا مکمل های حاوی ویتامین ث روزانه یک نوبت استفاده کنید.

● روزانه زخم خود را از نظر بروز علائم زیر بررسی کنید:

❖ تورم و قرمزی اطراف محل زخم .

❖ وضعیت ترشحات .

❖ خونریزی .

❖ خطوط قرمز رنگ برجسته اطراف زخم.

در صورت هر یک از علائم زیر مجدداً به اورژانس یا پزشک مراجعه کنید:

❖ آسیب یا پارگی بخیه ها و باز شدن مجدد زخم.

❖ درد شدید در محل زخم.

❖ تورم یا قرمزی محل زخم.

❖ خروج چرک یا ترشحات سبز رنگ از زخم یا

تشدید ترشحات اولیه.

❖ استنشام بوی بد از زخم.

❖ خونریزی مجدد از زخم به طوری که پس از ۱۰-۱۵

دقیقه فشار مداوم روی محل زخم متوقف شود.

خطوط قرمز رنگ برجسته اطراف محل زخم.

❖ بروز تب.

❖ برجسته و دردناک شدن غده های لنفی زیر بغل،

گردن یا کشاله ران (نزدیک به محل زخم).

❖ در صورت نیاز به مراجعه مجدد حتما خلاصه پرونده خود را همراه داشته باشید.