



۶۷-۳۲۳۳۲۰۶۵ (داخلی ۲۹۲)

www.Bimaramozesh.blogfa.com

Telegram.me/bimar_amozech

Insta:isa-diabet



کد: B.H.E.66

سال تهیه: پاییز ۱۳۹۴

بازنگری: ۱۴۰۰

سپسیس نوزادی یا عفونت خون نوزادان:

این حالت وضعیتی است که در آن بدن با یک عفونت جدی می‌جنگد، اگر نوزاد شما در وضعیت سپسیس قرار بگیرد، در حالت کاهش فشار خون که به آن شوک می‌گویند خواهد بود. این وضعیت یا بدلیل سیستم‌های دفاعی بدن یا بدلیل مواد سمی که توسط عوامل عفونی مانند باکتری، ویروس یا قارچ‌ها ایجاد می‌شود، حاصل می‌گردد.

این مشکل در هر سنی ممکن است اتفاق بیفتد اما در شیرخواران کم سن که سیستم ایمنی بدنشان به اندازه کافی رشد نکرده و افرادی با سیستم ایمنی ضعیف مانند افراد مبتلا به ایدز شایع‌تر است.

سپسیس نوزادی دو نوع دارد:

سپسیس اولیه: در هفته اول زندگی دیده می‌شود و اغلب در ۲۴ ساعت اول زندگی تظاهر می‌یابد. عفونت اغلب از مادر گرفته می‌شود. ممکن است بوسیله باکتری یا عفونت حاصل از مادر در طول بارداری، زایمان زودرس، جدایی پرده‌ها (جفت) که بیش از ۲۴ ساعت طول بکشد، عفونت جفت و مایع آمنیوتیک واژینال در طول زایمان ایجاد شود.

سپسیس ثانویه: نوع دوم بعد از زایمان حاصل می‌شود. ممکن است بوسیله تجهیزات آلوده بیمارستان، در معرض قرار گرفتن داروهایی که منجر به مقاومت آنتی‌بیوتیک می‌شوند، ایجاد گردد.

علائم و نشانه‌ها:



- ✚ بی‌اشتهایی و اشکال در غذا یا شیر خوردن.
- ✚ تب یا گاهی پایین آمدن غیر طبیعی دمای بدن.
- ✚ ناتوانی و سستی بدن.
- ✚ لتارژی و گیجی (فرد بی تفاوت می‌شود و نمی‌شنود).
- ✚ کاهش تن صدا مانند گرفتگی صدا.
- ✚ تغییرات ضربان قلب (تعداد زیاد یا تعداد کمتر از حالت طبیعی)
- ✚ تنفس سریع یا سخت
- ✚ قطع تنفس
- ✚ زردی
- ✚ تغییر رنگ پوست (رنگ پریده یا کبود)
- ✚ تورم یا برجستگی فونتanel‌ها در نوزادان (ملاج‌ها)

✚ هر گونه تغییر رفتار که شما را نگران کند.



تشخیص بیماری:

- آزمایش خون
- کشت خون
- آزمایش ادرار
- آزمایش و کشت نمونه از مایع نخاعی - مغزی.

درمان بیماری:



نوزاد مبتلا و یا حتی مشکوک به سپسیس حتما باید در بیمارستان بستری گردد و هر چه سریع تر آنتی بیوتیک های مورد نیاز از طریق وریدی تزریق شود.

نوزادان مستعد سپسیس:

- ✓ نوزادانی که در بخش های ویژه نوزادان بستری میشود مستعد ابتلا به سپسیس هستند.
- ✓ بیشترین علت این بیماری در نوزادان تازه متولد شده، ورود باکتری ها در طی حاملگی، زایمان و پس از زایمان به داخل بدن نوزاد می باشد.
- ✓ بعضی از حاملگی های پر خطر مانند: خونریزی، تب مادر، وجود عفونت در رحم یا جفت، پارگی زودرس کیسه آمنیوتیک، زایمان سخت و طول کشیده، باعث افزایش احتمال ابتلا نوزاد به سپسیس می شوند.



هشدارها:

✚ وجود هر گونه عفونت در نوزادان یا شیرخواران در مقایسه با اطفال و بالغین بسیار خطرناک تر خواهد بود. در این گروه ها سیستم ایمنی به خوبی شکل نگرفته است و هنوز توان مقابله با انواع عفونت ها را پیدا نکرده، همین علت است که گفته می شود باید درمان عفونت نوزادان در بیمارستان صورت گیرد.

✚ اگر دچار تب و علایمی شبیه خواب آلودگی، کم اشتهايي و مشکل تنفسي داشته باشد، بهتر است به پزشک مراجعه کنید.

مشاور علمی: آقای دکتر علی هوایی (متخصص کودکان و نوزادان)

منبع: هدایت اله صلاح زهی، فرنوش خجسته و سیما نظر پور، پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان. ۱۳۸۸.