



بیمارستان عیسی بن مریم (ع)

شیاف استامینوفن



واحد آموزش به بیمار

تاریخ تدوین: بهار ۱۳۹۶

بازنگری: ۱۴۰۰

کد پمفلت: H.E.98

شماره تماس با واحد آموزش به بیمار:

۶۷-۳۲۳۳۲۰۶۵ (داخلی ۲۹۲)

www.Bimaramozesh.blogfa.com
[Telegram.me/bimar_amozech](https://t.me/bimar_amozech)

علائم مسمومیت شدید ممکن است ۲-۴ روز پس از

مصرف مقادیر زیاد بروز نماید ولی برای جلوگیری از بروز

آسیب کبدی باید درمان را ظرف ۲۴ ساعت یا کمتر آغاز


کرد.

توجه:

مصرف زیاد استامینوفن می تواند

سبب آسیب کبد و سایر اثرات سمی

شود.



منبع:

✓ آبگون، محمد- داروهای ژنریک ایران-موسسه فرهنگی و

انتشارات نور دانش-۱۳۸۱

✓ بروشور دارویی شرکت دارو و پخش

علائم مسمومیت با استامینوفن:

بی اشتها، تهوع، استفراغ، سرگیجه، خواب آلودگی، تعریق مفرط، لرز درد در ناحیه معده یا شکم و اسهال می باشد.

اقدامات لازم در هنگام مسمومیت با استامینوفن:

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقادیر توصیه شده توسط پزشک، کودک را به بیمارستان انتقال دهید.



توجه: در صورت بروز تب توام با لرز یا بدون لرز،

درد در ناحیه تحتانی کمر، بثورات پوستی، کهیر یا

خارش، ضعف و خستگی غیر عادی، سریعاً به

پزشک مراجعه نمایید.



مقدار مصرف شیاف استامینوفن:

والدین عزیز مقدار مصرف شیاف را پزشک تعیین می نماید ولی مقدار مصرف محلول این دارو در کودکان:

۲-۵ سال: ۱۲۰ میلی گرم، هر ۴ تا ۶ ساعت

۶-۱۲ سال: ۳۲۵ میلی گرم، هر ۴ تا ۶ ساعت

توجه:

از مصرف دارو بدون
دستور پزشک
خودداری کنید.

۳. در صورتیکه شیاف هنگام مصرف نرم شده باشد به مدت 30 دقیقه در یخچال یا آب سرد قرار دهید.
۴. در صورت سابقه حساسیت به استامینوفن یا آسپرین در کودک، قبل از مصرف دارو به پزشک اطلاع دهید.

۵. به علت خطر آسیب کبدی، شیاف زودتر از ۴ تا ۶ ساعت استعمال نشود.

توجه: برای اطمینان از عدم خروج شیاف با زور زدن کودک، باسن های کودک را برای چند لحظه به هم حساسات و فشار دهید.

شرایط نگهداری دارو:

۱. شیاف استامینوفن باید در دمای کمتر از ۲۰ درجه نگهداری و از یخ زدگی محافظت شود.
۲. از نگهداری و مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری شود. تاریخ انقضاء در کنار عبارت "EXP" روی جعبه دارویی قید شده است.
۳. دارو را دور از دسترس کودکان قرار دهید و اجازه ندهید کودک از آن بعنوان شکلات یا اسمارتیز استفاده نماید.

والدین گرامی با آرزوی صحت و سلامت برای شما و فرزند دلبندتان، مطالب زیر جهت افزایش آگاهی شما در زمینه " شیاف استامینوفن " تهیه شده است.

شیاف استامینوفن:

شیاف استامینوفن دارویی است که برای کاهش تب و درد استفاده میشود. این شیاف به صورت دو دوز دارویی 125 و 325 mg می باشد.

نحوه مصرف شیاف استامینوفن:

۱. جهت استعمال شیاف ابتدا آن را از پوشش خارج نموده و با آب سرد مرطوب نمایید.
۲. کودک را به پهلو بخوابانید و با انگشت شیاف را از قسمت تیزی کاملاً داخل مقعد قرار دهید.

