

مشکلات مربوط به دستگاه اسکلتی بدن بسیار شایع بوده و تاثیر عمیقی بر فعالیت های روزمره و طبیعی زندگی دارند یکی از درمان هایی که در جهت رفع این مشکلات استفاده می شود ثابت کننده های خارجی است.

ثابت کننده های خارجی همانطور که از نامش پیداست وسیله ای است که در خارج عضو قرار داده شده است و با استفاده از پین هایی که در قطعات شکستی استخوان قرار می دهند، شکستگی را جا انداخته و بی حرکت می کنند و سپس وضعیت پین ها را با اتصال به یک چهارچوب و با استفاده از پیچ و مهره هایی ثابت می کنند و بدین ترتیب قطعات شکسته در امتداد صحیح خود ثابت می شوند.



مزایای استفاده از ثابت کننده ها خارجی:

بسته به شرایط استفاده از این روش باعث راحتی بیشتر، امکان راه افتادن سریعتر و انجام ورزش های فعال در مفاصل سالم مجاور محل صدمه دیده شده و به این ترتیب عوارض ناشی از بی حرکتی و عدم استفاده از عضو مبتلا را به حداقل می رساند.

در شکستگی های باز که همراه با آسیب شدید بافت نرم است و امکان گچ گیری وجود ندارد؛ این روش امکان درمان بافت نرم را نیز فراهم می کند.

در بعضی از شکستگی های پیچیده و خردشده پزشک معالج آن را بهترین درمان برای بی حرکت کردن قطعات می داند.

انواعی از آن با هدف افزایش طول استخوان بکار می رود.

مراقبت ها

- برای پیشگیری از تورم اندام با چند بالش آن را بالاتر از سطح قلب قرار دهید.
- طبق دستور پزشک طی ۲۴-۴۸ ساعت پس از عمل جراحی راه نروید.
- جهت پیشگیری از صدمه به بافتهای دیگر بدن، نوک تیز پین ها را با باند، پنبه و یا سرپوش های لاستیکی کوچک بپوشانید.
- هر روز انگشتان را از نظر رنگ، گرمی، حس و حرکت که نشانه سلامت عصبی و خونرسانی عضو است کنترل کنید و در

صورت رنگ پریدگی عضو؛ سردی؛ نداشتن حس در انگشتان و عدم توانایی در تکان دادن انگشتان به پزشک مراجعه کنید.

- به هیچ عنوان پیچ ها و گیره ها را دستکاری نکنید.

- هر روز ورزشهای بدن و عضو مبتلا را که توسط فیزیوتراپ به شما آموزش داده شده است انجام دهید تا عضلات عضو ضعیف نشوند.

- عضلات عضو مبتلا را ۵ تا ۱۰ ثانیه منقبض کنید و سپس شل سازید، این کار را چند بار در روز انجام دهید.

- در صورت وجود درد عضو را بالاتر از سطح قلب قرار دهید و از داروهای مسکن تجویز شده توسط پزشک استفاده نمایید.

- درد شدیدی را که با روشهای فوق درمان نشد به اطلاع پزشک برسانید.

- هنگام ضد عفونی، برای هر پین از یک گاز یا پنبه استفاده کنید.





بیمارستان عیسی بن مریم (ع)

فیکساتورهای خارجی



واحد آموزش به بیمار

تاریخ تدوین: بهار ۱۳۹۶

بازنگری: ۱۴۰۰

کد پمفلت: H.E.148

شماره تماس با واحد آموزش به بیمار:

۶۷-۳۲۳۳۲۰۶۵ (داخلی ۲۹۲)

www.Bimaramozesh.blogfa.com

[Telegram.me/bimar_amozech](https://t.me/bimar_amozech)

- هنگام ترخیص برگه خلاصه پرونده؛ شرح عمل؛ کارت نوبت درمانگاه و در صورت لزوم نسخه دارویی که به شما تحویل داده می شود را زمان مراجعه به پزشک همراه داشته باشید.
- باید بدانید که کمک در مراقبت از خود جهت موفقیت این شیوه درمانی ضروری است.

مشاور علمی: آقای دکتر مهدی ضیائی (متخصص ارتوپدی)

منبع: نصیری. فریبا، پرستاری داخلی- جراحی، برونر سوارث (ارتوپدی): ۲۰۱۰، نشر جامع نگر - سالمی.

درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان

عیسی بن مریم (ع) با ارائه خدمات زیر همه

روزه آماده خدمت رسانی می باشد. جهت

اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۲۲۴۴۱۷۷۹

تماس بگیرید.

صبح ها (ساعت: ۱۲:۰۰-۷:۳۰)

بعد از ظهرها (ساعت: ۱۹:۰۰-۱۴:۰۰)

کلینیک دیابت (بارداری و غیر بارداری) - کلینیک پوست و مو (جراحی پلاستیک، زیبایی) - طب فیزیکی و نوار عصب عضله - غدد - گوارش - قلب و عروق - اطفال - نوزادان - زنان و مامایی - داخلی و جراحی مغز و اعصاب - داخلی - جراحی عمومی - ارولوژی - تغذیه و رژیم درمانی - ارتوپدی - آسم و آلرژی - گوش و حلق و بینی - روانپزشکی - طب سالمندان - کلینیک زنان - بیماری های عفونی

برای جلوگیری از عفونت مسیر پین ها آنها را به روش زیر مراقبت کنید:

- به روش استریل کار کنید و قبل از شروع به کار دستهای خود را کاملاً با آب و صابون بشوئید.
- گیره های روی چهارچوب ثابت کننده ی خارجی را دست کاری نکنید.
- هر روز محل پین ها را با پنبه یا گاز تمیز آغشته به سرم شست و شو تمیز کنید.
- برای هر پین از یک گاز یا پنبه استفاده کنید.
- محل پین ها را از نظر علائم عفونت مثل قرمزی، ترشح چرکی، تورم، حساسیت و شل شدگی کنترل کنید. در صورت وجود علائم عفونت یا شل شدن پین ها به پزشک اطلاع دهید.
- البته وجود کمی ترشح بیرنگ یا زرد کم رنگ در اطراف پین طبیعی است.
- دستورات دارویی پزشک را حتما رعایت کنید و در فواصل تعیین شده از طرف پزشک به ایشان مراجعه کنید.
- گاهی پس از ترمیم بافتهای نرم صدمه دیده ثابت کننده خارجی برداشته شده و درمان با گچ یا روشهای دیگر ادامه می یابد در صورتیکه شکستگی به نحو مطلوبی با ثابت کننده درمان شده باشد تا بهبودی کامل استخوان نگه داشته می شود.