

- محفظه درن را فشار دهید تا جمع شود سپس دریچه را ببندید.



- مراقب باشید درن از محل خارج نگردد.
- در آخر کلیپس را باز کنید تا مسیر درن باز شود.



- ✓ درن را می توانید داخل کیسه تمیز قرارداده و با خود حمل کنید.

نحوه ایجاد خلاء در درن و تخلیه ترشحات درن:

در صورتی که با درن هایی به شکل زیر مرخص شدید قبل از ترخیص، چگونگی تخلیه ترشحات و اندازه گیری مایع حاصل از درناژ را از پرستار یاد بگیرید. شستن دستها قبل و بعد از خالی نمودن درن ها اهمیت زیادی دارد.

- ابتدا مسیر درن را با کلیپس درن ببندید.



- بالای درن دو دریچه است، دریچه ای که به شلنگ وصل نیست را باز کنید.



- مایع داخل آن را درون درون ظرف سرم که درجه دارد بریزید و میزان درجه را خوانده و بر روی کاغذ یادداشت نمایید و مایع را در توالی تخلیه کنید .



مراقبت از درن یا وکیوم زخم

به لوله ها که در محل جراحی گذاشته شده است "درن" می گویند.

پزشک جراحی در حین عمل جراحی ممکن است لوله های پلاستیکی در درون زخم بیمار بگذارد تا بدین وسیله خونریزی مختصر داخل بدن که ممکن است تا چند ساعت بعد از جراحی هم ادامه داشته باشد به بیرون از بدن هدایت کند.

باقی ماندن خون در درون بافت ها خطر عفونت بعد از جراحی را بیشتر می کند و این خونریزی ها باید در صورت وجود از بدن به وسیله این لوله ها خارج شوند.

لوله ها در بیرون از بدن به کیسه های پلاستیکی متصل می شوند تا خون در آنها جمع آوری شود.

این لوله ها بعد از چند روز از زخم خارج می شوند.





بیمارستان عیسی بن مریم (ع)

مراقبت از لوله های درناژ



واحد آموزش به بیمار

تاریخ تدوین: زمستان ۱۳۹۵

بازنگری: ۱۴۰۰

کد پمفلت: H.E. 123

شماره تماس با واحد آموزش به بیمار:

۶۷-۳۲۳۳۲۰۶۵ (داخلی ۲۹۲)

www.Bimaramozesh.blogfa.com

Insta: isa-diabet

[Telegram.me/bimar_amozech](https://t.me/bimar_amozech)

مشاور علمی: آقای دکتر مسیح معصومی (متخصص جراحی عمومی)
منبع: غفاری، ف و فتوکیان، ز. آموزش به بیمار و خانواده، بشری، ۱۳۸۸، چاپ اول

درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان
عیسی بن مریم (ع) با ارائه خدمات زیر **همه**
روزه آماده خدمت رسانی می باشد. جهت
اطلاعات بیشتر با شماره تلفن **۴۴۴۶۱۷۷۹**
تماس بگیرید.

صبح ها (ساعت: ۱۲:۰۰ - ۷:۳۰)

بعد از ظهرها (ساعت: ۱۹:۰۰ - ۱۴:۰۰)

کلینیک دیابت (بارداری و غیر بارداری) - کلینیک پوست و مو (جراحی پلاستیک، زیبایی) - طب فیزیکی و نوار عصب عضله - غدد - گوارش - قلب و عروق - اطفال - نوزادان - زنان و مامایی - داخلی و جراحی مغز و اعصاب - داخلی - جراحی عمومی - ارولوژی - تغذیه و رژیم درمانی - ارتوپدی - آسم و آلرژی - گوش و حلق و بینی - روانپزشکی - طب سنتی - آندوسکوپی و کولون سکوپ - کلینیک زنانو - بیماری های عفونی

نکته:

- در صورت خارج شدن درن از محل خود، روی محل درن یک گاز استریل گذاشته و به پزشک مراجعه کنید.
 - دقت کنید که لوله ها دچار پیچ خوردگی نشوند.
 - از فشار و خم شدن لوله ها خودداری کنید.
 - محفظه جهت تسهیل درناژ ترشحات پایین تر از بدن قرار گیرد.
 - درن همیشه باید درحالت خلاء یا شارژ قرار گیرد.
 - داروها را طبق دستور پزشک استفاده کنید.
 - جهت پیگیری درمان با پزشک معالج خود ملاقات داشته باشید.
 - در مورد زمان کشیدن بخیه ها و تعویض پانسمان از جراح خود سوال کنید.
- در صورت مشاهده علائم زیر فوراً گزارش دهید:**
- تغییر رنگ ناگهانی درناژ
 - قطع ناگهانی درناژ
 - علائم و نشانه های عفونت (درناژ بدبو، افزایش درجه حرارت)